

PGT – TEST DELLE FIGURE SOVRAPPOSTE DI POPPELREUTER-GHENT

Vers. De Renzi et al., 1993

Procedura di somministrazione: Si invita il Soggetto ad indicare tra le 10 figure poste al di sotto della linea di ogni tavola, quelle che compaiono sovrapposte, al di sopra; in ogni tavola possono essere sovrapposte 3, 4 o 5 figure, è necessario evitare qualunque tipo di suggerimento sulle strategie da adottare per una corretta esecuzione del compito.

Il test è costituito dalle 10 tavole con figure che rappresentano oggetti comuni (MF), senza pre-test, e dalle 9 tavole che rappresentano figure astratte (ML).

PUNTEGGIO: viene dato 1 punto per ogni risposta corretta in ogni tavola.

MF (Oggetti Comuni)			
Tavola	Risp corr	Risp. sogg.	P.G.
1 (4)	3, 6, 7, 10		/4
2 (5)	1, 2, 6, 8, 9		/5
3 (4)	3, 6, 8, 9		/4
4 (4)	4, 6, 7, 9		/4
5 (4)	3, 4, 8, 9		/4
6 (5)	3, 5, 6, 9, 10		/5
7 (3)	1, 3, 10		/3
8 (4)	2, 3, 9, 10		/4
9 (3)	2, 5, 10		/3
10 (4)	4, 5, 9, 10		/4
P. Grezzo MF			/40

Range di Normalità: 38-40

ML (Figure Astratte)			
Tavola	Risp corr	Risp. sogg.	P.G.
1 (4)	1, 4, 8, 9		/4
2 (4)	1, 4, 5, 9		/4
3 (4)	2, 3, 5, 8		/4
4 (4)	1, 3, 6, 9		/4
5 (4)	1, 4, 7, 10		/4
6 (4)	1, 4, 7, 10		/4
7 (3)	2, 5, 10		/4
8 (5)	2, 3, 6, 8, 9		/5
9 (3)	2, 3, 8		/3
P. Grezzo ML			/35

Range di Normalità: 32-35